

Name	Vorname	Geb.-Datum
------	---------	------------

Zeitpunkt der Diagnose:	Tumorstadium:	Lokalisation
-------------------------	---------------	--------------

Primärtherapie

Operation	
Chemotherapie	
Radiatio	

Kolonkarzinom (pT1, N0, M0)

Jahr	1		2		3	4	5
Monat	6	12	18	24	36	48	60
Anamnese							
Körperliche Untersuchung	•b	•	•	•	•	•	•
Koloskopie a	•b			•			•

- a 3 Monate postoperativ, wenn präoperativ Abklärung des gesamten Kolons nicht möglich, nach dem 5. Jahr alle 3 Jahre Koloskopie
- b Nach endoskopischer Abtragung (low risk sm1 und sm2)

Kolonkarzinom (UICC II und III)

Jahr	1		2		3	4	5
Monat	6	12	18	24	36	48	60
Anamnese							
Körperliche Untersuchung	•	•	•	•	•	•	•
CEA	•	•	•	•	•	•	•
Sonografie Abdomen	•	•	•	•	•	•	•
Röntgen-Thorax in 2 Ebenen		•		•	•		•
Koloskopie a				•			•
Rektoskopie b				•		•	

- a 3 Monate postoperativ, wenn präoperativ Abklärung des gesamten Kolons nicht möglich, nach dem 5. Jahr alle 3 Jahre Koloskopie
- b nach subtotaler Kolektomie

HNPCC: ohne subtotale Kolektomie: 2-jährige Koloskopie, wenn kein Adenomnachweis in der Vorsorgeuntersuchung

Spiral-CT Abdomen befundorientiert (z.B. bei unklarem Sonografiebefund, CEA-Anstieg)

Kolonkarzinom im Stadium UICC IV

Nach kurativer Resektion von Lungen- und Lebermetastasen sollten alle 6 Monate neben klinischen Untersuchungen und Tumormarkerbestimmung bildgebende Verfahren zum Ausschluss von weiteren Metastasen durchgeführt werden, da in diesem Fall eine erneute Reintervention prognostisch relevant sein kann.