

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	

Zeitpunkt der Diagnose:	Tumorstadium:
-------------------------	---------------

Primärtherapie

Operation	
Chemotherapie	
Radiatio	

Rektumkarzinom (lokale Exzision und pT1, N0, M0)

Jahr	1		2		3	4	5
	6	12	18	24	36	48	60
Anamnese Körperliche Untersuchung	•	•a	•a	•	•	•	•
Rektoskopie/ Sigmoidoskopie, evtl. Endosonographie	•	•a	•a				
Koloskopie				•			•

- a Nach endoskopischer Abtragung eines gestielten Polypen mit pT1-Karzinom low risk sind bei tumorfreier Polypenbasis die Nachuntersuchungen nach 12 und 18 Monaten entbehrlich.
- b Drei Monate postoperativ, wenn präoperativ Abklärung des gesamten Kolons nicht möglich, nach dem fünften Jahr alle drei Jahre Koloskopie.

Rektumkarzinom (alle anderen Stadien)

Jahr	1		2		3	4	5
	6	12	18	24	36	48	60
Anamnese Körperliche Untersuchung	•	•	•	•	•	•	•
CEA	•	•	•	•	•	•	•
Sonografie Abdomen	•	•	•	•	•	•	•
Röntgen-Thorax in 2 Ebenen		•		•	•		•
Koloskopie				•			•
Nach Rektumresektion: Rektoskopie/Sigmoidoskopie, evtl. Endosonografie	•	•	•		•a		•a

Spirat-CT Becken:

3 Monate nach Abschluss der tumorspezifischen Therapie (OP bzw. Strahlen-/ Chemotherapie)

- a Nach adjuvanter Strahlen-/Chemotherapie wegen verzögert auftretender Lokalrezidive
- b 3 Monate postoperativ, wenn präoperativ Abklärung des gesamten Kolons nicht möglich, nach dem 5. Jahr alle 3 Jahre Koloskopie